

Avertissements agricoles



Bulletin Technique n° 14 du 9 juin 1989

- | | |
|------------------------|---|
| * BLE D'HIVER : | - De fortes infestations de Pucerons sur Pernel |
| | - Ne négligez pas la Rouille brune |
| * BETTERAVE SUCRIERE : | - Vigilance face aux pucerons |
| * POIS PROTEAGINEUX : | - Début timide du vol des Tordeuses |
| | - Présence de Pucerons |
| * POMME DE TERRE : | - Des risques de mildiou |
| | - Lutte obligatoire contre le Doryphore |

** BLE D'HIVER **

-----PUCERONS

* **SITUATION** : les infestations de pucerons des épis se généralisent. Le niveau de population varie beaucoup entre parcelles, de très faible à très fort, sur la variété Pernel notamment où le seuil d'un épi sur deux colonisé est souvent atteint.

* **PRECONISATION** : intervenir d'urgence si le seuil est atteint.

-----MALADIES

* **SITUATION** : mis à part quelques blés fortement contaminés par Oïdium et Septoriose, les parcelles protégées pendant la floraison présentent un état sanitaire satisfaisant.

Les pustules de Rouille brune sont fréquentes mais les conditions météorologiques actuelles ne favorisent pas leur évolution. Quelques foyers de Rouille jaune sont signalés : les attaques sont faibles pour l'instant et limitées à la variété Thésée.

* **PRECONISATION** :

► en absence de Rouille, les traitements doivent maintenant être terminés.
► les foyers de Rouille brune, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un traitement depuis le bulletin précédent, seront surveillés jusqu'à fin floraison. Si la chaleur se rétablit, un traitement sera réalisé dès l'apparition des pustules sur l'une des trois premières feuilles : en conditions favorables, la maladie pourraient progresser très rapidement.

► concernant les foyers de Rouille jaune : surveillez leur apparition. Le cas échéant, intervenez dès l'observation des premières pustules.

** BETTERAVE SUCRIERE **

-----PUCERONS

Le vol de pucerons se poursuit et nécessite de poursuivre la protection. La lutte contre la jaunisse de la Betterave doit obligatoirement passer par la maîtrise de ses vecteurs.

La période de sensibilité continuera jusqu'au stade 10-12 feuilles, (couverture du sol par le feuillage).

Imprimerie de la Station de STRASBOURG
Directeur-Gérant : P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
D. R. A. F.
Service Régional de la Protection des Végétaux

Cité Administrative
67084 STRASBOURG CEDEX

☎ 88.37.32.18
Bas-Rhin : 88.69.65.89 - Haut-Rhin : 89.72.49.70

Publication périodique

CPPAP n° 1848 AD

Abonnement annuel : 180,-F



P 356

**** POIS PROTEAGINEUX ******----TORDEUSES**

* *SITUATION* : le vol débute très timidement : 1 capture tous les 3 jours au piège sexuel.

* *PRECONISATION* : toute intervention est actuellement inutile.

----PUCERONS

Présence de pucerons verts et de pucerons noirs à surveiller. Une intervention est nécessaire si 30 pucerons sont dénombrés par plante en moyenne.

**** POMME DE TERRE ******----MILDIOU**

* *SITUATION* : les conditions météorologiques sont favorables aux contaminations.

* *PRECONISATION* : maintenez la protection.

----DORYPHORE

* *STRATEGIE DE LUTTE* : surveillez l'apparition des larves. Le traitement doit être réalisé lorsqu'elles ont la grosseur d'un grain de blé. Nous rappelons que **LA LUTTE CONTRE LE DORYPHORE EST OBLIGATOIRE.**

* *PRODUITS UTILISABLES* (dose de matière active g/ha) : alphaméthrine (12,5) (FASTAC) ; azinphos méthyl (400) (nombreuses spécialités) ; carbaryl (750) (SEVIN L85, SEVIN L85 P) ; chlorfenvinphos (250) (BIRLANE CE40) ; cyfluthrine (15) (BAYTHROID) ; cyperméthrine (30) (KAFIL SUPER, SHERPA 10, CERBERE, CYMBUSH) ; deltaméthrine (7,5) (DECIS, DECIS Flo) ; endosulfan (350) (THIODAN 35 CE, TECHN'UFAN) ; fenvalérate (50) (SUMICIDIN 10) ; fluvalinate (MAVRIK à 0,2 l p.c./ha) ; lambda cyhalothrine (KARATE à 0,15 l p.c./ha) ; LINDANE (90) (nombreuses spécialités) ; méthidathion (300) (ULTRACIDE 20) ; mercaptodiméthur (1 000) (MESUROL 50) ; phosalone (600) (ZOLONE FLO) ; phosmet (500 g) (IMIDAN) ; phosphamidon (300) (DIMECRON 10) ; carbaryl + lindane (NAFTILO : 0,5 kg p.c./ha) ; carbaryl + cuivre + endosulfan + zinèbe (DORYPHIT : 5 kg p.c./ha).

ATTENTION : délai de carence avant récolte de 15 jours pour certaines spécialités à base de lindane.

**COLZA 89 :
UN ÉQUIPAGE EUROPÉEN
ET UNE PLATEFORME
DE 30 HECTARES**

Tous les partenaires européens de la filière colza seront rassemblés autour de parcelles de démonstration et de stands pour constituer un espace d'information exceptionnel : l'INRA, le CETIOM, les organismes de recherche et de développement, les établissements de semences, les firmes phytosanitaires, le matériel spécialisé, les entreprises de transformation et les organismes économiques.



DIJON 14 & 15 JUIN

**COLZA 89 :
LES 14 ET 15 JUIN 1989
A TIL-CHATEL
(PRÈS DE DIJON)**

Entrée gratuite. Ouvert de 10 heures à 19 heures. Situé à la sortie de l'autoroute Nancy-Dijon.
Accès par l'autoroute, le T.G.V., l'avion...

**COLZA 89 :
UN GRAND PAS
POUR L'EUROPE DU COLZA**

Vous connaîtrez tout sur l'actualité du colza et son avenir européen.

**COLZA 89 :
UNE RESTAURATION
DE "TERROIR"**

Sur place, vous trouverez tout pour vous restaurer au mieux. En Bourgogne, on tient à sa réputation culinaire.